


Llevo una prótesis dentosoportada, ¿ahora qué hago?

En cualquier tipo de prótesis, la adaptación requiere un cierto tiempo. Al principio, notará una sensación de ocupación en la boca que desaparecerá en unos días. Puede notar cambios en la salivación o en el gusto, que se irán normalizando con el tiempo.



Al manipular la prótesis, evite que esta caiga al suelo o reciba golpes, ya que podría romperse o deformarse.



Puede notar molestias en la encía donde se apoya la prótesis. En ese caso, acuda al odontólogo antes de que aparezcan heridas, ya que pueden ser muy dolorosas.

Es probable que los primeros días, se muerda en las mejillas o la lengua debido a que tienden a meterse en los espacios donde faltan dientes. Para evitarlo, procure cerrar la boca y masticar con cuidado.

**Dib
Bucodental**



Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir las siguientes recomendaciones sobre cuidado y mantenimiento de su prótesis

La prótesis fija exige más cuidados en la higiene dental diaria y una vigilancia más frecuente. Con el tiempo, es posible que las encías mermen y se descubra la "junta" entre el diente y la prótesis, afectando a la estética. A veces, los dientes que soportan la prótesis sufren alguna lesión irreversible y es necesario extraerlos. En ambos casos, puede que deba sustituir su prótesis por una nueva

Los primeros días, puede sentir que los dientes de la prótesis son más grandes que los que tenía anteriormente, pero esta sensación desaparecerá poco a poco. Si se le ha cementado la prótesis provisionalmente, es posible que se caiga o que sienta sensibilidad

La prótesis es fija, por lo que no podrá quitársela en casa. Si se mueve o se despega, guárdela y acuda a su odontólogo, ya que es posible que pueda volver a cementarse

La higiene de la boca debe hacerse después de cada comida. Debe lavarse los dientes como lo hacía con sus dientes naturales, con un cepillo y pasta de dientes. Si tuviese ausencia de algún diente, en ese espacio debe pasarse un cepillo interdental, entre la encía y la prótesis. También puede usar un irrigador dental, que en estos casos es muy beneficioso



Es aconsejable acudir a su dentista periódicamente para evitar la aparición de caries en los dientes bajo la prótesis, inflamación de encías u otros problemas

Es conveniente realizar una revisión al menos una vez al año

**Dib
Bucodental**

