

# Llevo una prótesis parcial, ¿ahora qué hago?

En cualquier tipo de prótesis, la adaptación requiere un cierto tiempo. Al principio, notará una sensación de ocupación en la boca que desaparecerá en unos días. Puede notar cambios en la salivación o en el gusto, que se irán normalizando con el tiempo.




Al manipular la prótesis, evite que esta caiga al suelo o reciba golpes, ya que podría romperse o deformarse.



Puede notar molestias en la encía donde se apoya la prótesis. En ese caso, acuda al odontólogo antes de que aparezcan heridas, ya que pueden ser muy dolorosas.

Es probable que los primeros días, se muerda en las mejillas o la lengua debido a que tienden a meterse en los espacios donde faltan dientes. Para evitarlo, procure cerrar la boca y masticar con cuidado.

**Dib  
Bucodental**



**Para conseguir un buen funcionamiento, deberá seguir las siguientes recomendaciones sobre cuidado y mantenimiento de su prótesis**

**Al principio, es común notar presión sobre las encías o los dientes, que suelen desaparecer en pocos días, al “endurecerse” las encías y adaptarse los dientes a la fuerza que produce la prótesis**

**Al principio puede costarle un poco colocarse y retirarse la prótesis, aunque se acostumbrará rápidamente, una vez aprenda la dirección en la que debe “apretar” para llevarla a su sitio. Para su colocación, situará los ganchos en los dientes sobre los que apoyan y presionará con los dedos hasta que oiga un “click”. No fuerce la prótesis ni muerda para llevarla a su lugar, ya que podría dañarla. Para quitarse la prótesis, tirará con las uñas de los ganchos de ambos lados a la vez, con cuidado de no arañarse la encía**



**En este tipo de prótesis, es fundamental no dejar de ponérselas durante más de un día seguido, ya que las encías y los dientes pueden moverse y la prótesis ya no entrará en su lugar, teniendo que ajustarla o incluso repetirla**

**Después de cada comida, debe retirarse la prótesis y lavarla con agua y jabón y un cepillo especial para prótesis o un cepillo de uñas. Es especialmente importante cepillarse los dientes que quedan en boca. Es recomendable que, una vez al mes, la prótesis se deje durante la noche en un vaso con agua y una pastilla desinfectante (que puede encontrar en la farmacia). Tras quitarse la prótesis, lávela y consérvela en un vaso con agua**



**Si surge algún problema con la prótesis, acuda al odontólogo. Las encías, con el tiempo, pueden mermar, por lo que la prótesis se desajusta y puede moverse, necesitando una corrección. Si se pierde algún diente que sujeta la prótesis, puede añadirse a la prótesis**

**Es conveniente realizar una revisión al menos dos veces al año**

**Dib  
Bucodental**

